4. **Avisar imediatamente as autoridades do município ou do estado** se notar ou souber da existência da mosca da carambola na sua comunidade.
5. **Repassar as informações para outras pessoas,** para que elas ajudem a combater a mosca da carambola. Todos precisam colaborar, para que as pessoas e o país não sofram com a perda de renda e a falta de emprego.

O que fazer se você suspeitar de uma mosca da carambola no seu plantio?

1. Informar as autoridades e a comunidade sobre o problema. Veja endereços e telefones neste folheto.
2. Colher os frutos maduros e os caídos no chão, colocar os frutos num saco plástico fechado e deixar ao sol por sete dias para matar as larvas da mosca. Depois, enterrar os frutos em buracos com profundidade de pelo menos 20cm do solo.
3. Não transportar os frutos hospedeiros suspeitos para regiões livres da praga.

O que diz a lei

É proibido por lei o transporte e o comércio de frutos hospedeiros de regiões infestadas para locais livres da praga. Quem transportar ou vender frutos hospedeiros nas regiões com presença da mosca da carambola pode sofrer penalidades impostas pela lei.

www.agricultura.gov.br

0800-7041995

Informações e denúncias

Amapá

Superintendência Federal de Agricultura no Amapá (SFA/AP)
Rua Tiradentes, 469
Centro
CEP: 68.900-068
Macapá/AP
gab-ap@agricultura.gov.br
Fone: (96) 3233-6443 / 3223-3075

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá - Diagro
Av. José Tupinambá, 196
Bairro do Laguinho
CEP: 68.900-000
Macapá/AP
Telefone: (96) 3312-1200 / 3312-1235

UTRA de Laranjal do Jarí
Av. Liberdade, 765
Bairro do Agreste
CEP: 68.920-000
Laranjal do Jarí/AP

Roraima

Superintendência Federal de Agricultura em Roraima - SFA/RR
Av. Santos Dumont, 1470
Bairro Aparecida
CEP: 69.306-040
Boa Vista / RR
sifisv-rr@agricultura.gov.br
Fone: (95) 3623-3736 / 3623-9605
Fax: (95) 6323-9364

Agência de Defesa Agropecuária de Roraima - ADERR
Av. General Penha Brasil, 1121
Bairro São Francisco
CEP: 69.305-130
Boa Vista / RR
Fone: (95) 2121-8684

Pará

Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Pará (SFA/PA)
Av. Almirante Barroso, 5384 - Castanheira
CEP: 66.645-250
Belém/PA
sisv.pa@agricultura.gov.br
Fone: (91) 3214-8648 / 3214-8636
Fax: (91) 3214-8648

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ)
Travessa Piedade, 651
Reduto
CEP: 66.053-210
Belém/PA
gab@adepara.pa.gov.br
Fone: (91) 3210-1100 / 3210-1175
0800 280 7383

Escritório local de atendimento ADEPARÁ
Rua 93, cs 126
Intermediário
CEP: 68240-000
Monte Dourado/PA
Fone: (93) 3735-1099

Secretaria de **Defesa Agropecuária**

Ministério da **Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Programa de Erradicação da Mosca da Carambola

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MOSCA DA CARAMBOLA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Uma nova praga no Brasil

Existem muitas moscas que atacam os frutos e põem ali seus ovos, que se transformam em larvas (bicho-da- fruta). Há poucos anos, entrou no Amapá, pela Guiana Francesa, a mosca da carambola, que é muito perigosa e traz enormes riscos econômicos aos produtores. Ela agora chegou ao estado de Roraima pela Guiana.

Prejuízos para todos

Os países que compram produtos do Brasil não aceitam frutos de regiões onde há mosca da carambola. Se a mosca sair do Amapá e de Roraima e se espalhar para outros estados, o Brasil e muitos produtores terão grandes prejuízos, pois não poderão vender os frutos. Isso vai causar desemprego e perda de renda para produtores e comerciantes.

Como é a mosca da carambola

É muito pequena, com cerca de 8mm de comprimento, e é preciso ser treinado para poder identificar a mosca. A parte superior do tórax é de cor escura e o abdômen é amarelo, com listras pretas que formam um T.
A mosca da carambola é mais perigosa que outras porque se reproduz muito rápido, deixando muitos ovos em cada fruto.

Fêmea

Macho

A mosca da carambola tem 8mm de comprimento. A parte superior do tórax é de cor escura e o abdômen é amarelo, com listras pretas que formam um T.

Principais frutos que a mosca pode atacar

Além da carambola, a mosca ataca muitos frutos: manga, goiaba, amendoeira (sete copas), tangerina, maçaranduba, laranja, taperebá, jaca, abiu, tomate, jambo, caju e outros.

Como a mosca se multiplica

A mosca fêmea cruza com o macho e bota os ovos muito pequenos dentro dos frutos. Dos ovos nascem as larvas (os bichos-da-fruta) que se alimentam da polpa estragando os frutos. Após a queda do fruto, a larva se enterra no chão, transforma-se em mosca e sai voando em direção aos frutos. Com trinta dias de vida, a fêmea fertilizada começa a colocar seus primeiros ovos nos frutos hospedeiros. Na busca por um fruto onde deixar seus ovos, a mosca da carambola consegue voar até cinco quilômetros.

Quantos ovos põe a mosca da carambola

Uma mosca coloca em média de 1.200 a 1.500 ovos durante sua curta vida de 126 dias.



O que você pode fazer para acabar com a mosca da carambola

1. **Não transportar frutos de locais infestados para outras áreas.** Os frutos podem estar com ovos ou bicho-da-fruta, que vão se reproduzir e infestar outras regiões, com sérios prejuízos para todos.
2. **Colher os frutos maduros, recolher os caídos no chão e colocar em sacos plásticos fechados.** Deixar por sete dias ao sol e depois enterrar. Ao deixar no sol por sete dias e depois enterrar você destrói ovos e larvas que possam estar ali dentro. Os frutos maduros ou caídos no chão devem ser enterrados em covas com pelo menos 20 cm de profundidade.
3. **Não mexer nas armadilhas** colocadas em caramboleiras, mangueiras, jambeiros e goiabeiras, que servem para indicar a existência da mosca em sua cidade. Armadilhas McPhail capturam as fêmeas e armadilhas Jackson capturam os machos.

Armadilha de Jackson

Armadilha McPhail